

Sulfato de Bário



Opti-Bar

66,7% p/v.

Cada 100ml de suspensão contém 66,7g de sulfato de bário.

Embalagem de 150ml e 1900ml.

Administração oral e retal.



Meio de contraste baritado, indicado para diagnósticos por imagem do trato gastrointestinal.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Suspensão a 66,7% p/v – Frascos Plásticos
contendo: 150ml, 1900ml Pó a 98% p/p
– Bolsa Plástica contendo: 340g

USO ORAL E RETAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE

INDICAÇÃO

Esse medicamento é um contraste indicado para diagnóstico na realização de exames de RX, nas diferentes formas de visualização de todo o trato gastrointestinal. Medicamento destinado somente ao diagnóstico. Não possui nenhuma indicação terapêutica.

CONTRAINDICAÇÕES

O sulfato de bário é contraindicado aos pacientes que apresentam os seguintes problemas:

- Suspeita ou obstrução do cólon (a administração oral de Sulfato de Bário aumenta o risco de impactação);
- Perfuração do trato gastrointestinal;
- Deve-se considerar o risco-benefício nos casos dos pacientes apresentarem alergia ou asma, sensibilidade ao Bário, fibrose cística, desidratação, diverticulites, cistites ulcerativas, obstrução do trato intestinal.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer a gravidez ou iniciar amamentação durante o uso desse medicamento.

Não há contraindicação relativa à faixas etárias.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outromedicamento.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não utilizar a suspensão depois de 24 horas de preparada.

Incidentes com relação à perfuração do intestino ou granuloma podem ser associados à técnica de administração ou ao estado patológico do paciente.

Após a administração do Sulfato de Bário, podem ocorrer vômitos ou parada cardiopulmonar. Essas reações são geralmente relatadas em crianças ou pacientes idosos.

Deve-se ter cuidado com os pacientes que apresentarem relatos de prévia alergia ou hipersensibilidade ao sulfato de bário (princípio ativo) e excipientes.

Os médicos devem ter cautela com os pacientes com histórico de asma brônquica. Especial atenção com aqueles pacientes debilitados ou com os que apresentem hipertensão ou doenças cardíacas.

O Sulfato de Bário deve ser usado somente sob a supervisão do médico especialista ou técnico profissionalmente qualificado.

A suspensão do Sulfato de Bário não é recomendada para uso oral em pacientes com histórico de broncoaspiração, se necessário, administrar em quantidades pequenas. Se ocorrer uma aspiração para a laringe, interromper a administração imediatamente.

Vários pacientes requerem previamente o uso de catárticos ou uma dieta líquida. Esses devem ser imediatamente reidratados após o exame. Naqueles que se conhece uma redução da motilidade do cólon, talvez seja necessário o uso de catárticos salinos após o uso do sulfato de bário.

Nas mulheres grávidas, o risco-benefício deve ser avaliado para não expor o feto ao efeito dos raios-X.

Nos exames que utilizem cânulas retais com balão, este deve ser inflado usando o fluoroscópio para evitar que seja enchido além do necessário. Esse procedimento pode pressionar o nervo vago, provocando uma reação vasovagal com episódio de síncope.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

A Suspensão 66,7% já vem pronta para uso. Agite antes de usar.

O Pó 98% para suspensão deverá ser preparado no momento do uso, adicionando o volume de água de acordo com a concentração desejada. Agitar fortemente por 30 segundos deixar em repouso por 5 minutos e agitar novamente. A suspensão depois de preparada deve ser utilizada dentro de no máximo 4 horas. A porção não utilizada deve ser descartada.

BOLSA 340g

A quantidade e a concentração utilizadas serão determinadas pelo médico radiologista de acordo com o equipamento disponível e a técnica a ser utilizada.

%p/v Sulfato de Bário	Volume total (ml)
66,64	500,00
33,32	1000,00
22,21	1500,00
16,66	2000,00
13,33	2500,00
11,10	3000,00

Suspensão

Adulto: sugere-se beber 300ml.

Crianças: diluir de acordo com a idade e estudo a ser realizado.

Pó

Adulto: a critério do médico radiologista, de acordo com o estudo a ser realizado.

Crianças: diluir de acordo com a idade e estudo a ser realizado.

Reações adversas

De incidência frequente (1/100): constipação; câimbra abdominal; diarreia. De incidência pouco frequente (1/1000): reações alérgicas atribuídas aos componentes da suspensão de sulfato de bário; apendicite; impactação fecal. Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema e Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA.

Uso restrito aos hospitais.

Venda permitida para hospitais, clínicas e ambulatórios.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

Alko do Brasil Ind. Com. Ltda. • Farm. Resp. Dra. Luciana R. Alves Carneiro • CRF-RJ 15386 – CNPJ: 32.137.424/0001-99 • RMS: 130450008